

B. NOTICE

NOTICE**Catosal, 100 mg/ml / 0,05 mg/ml, solution pour injection****1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Allemagne

Fabricant responsable de la libération des lots:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel
Allemagne

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Catosal, 100 mg/ml / 0,05 mg/ml, solution pour injection pour bovin, veau, chien, chat et animaux à fourrure.

Butaphosphane / Cyanocobalamine

3. LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET AUTRES INGRÉDIENTS

Par ml:

Principes actifs:

Butaphosphane 100 mg
Cyanocobalamine (vitamine B₁₂) 50 µg

Excipients:

n-Butanol 30 mg

4. INDICATIONS

Affections et troubles aigus et chroniques du métabolisme phosphorique et comme adjuvant à une thérapie de calcium.

5. CONTRE-INDICATIONS

Aucune.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Aucun connu.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCES CIBLES

Bovin, veau, chien, chat et animaux à fourrure.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION

POSOLOGIE

Affections aiguës:

- bovin: 5-25 ml Catosal par animal;
- veau: 5-12 ml Catosal par animal;
- chien: 0,5-5 ml Catosal par animal;
- chat, animaux à fourrure: 0,5-2,5 ml Catosal par animal.

A renouveler au besoin quotidiennement.

Affections chroniques:

La moitié des doses ci-dessus. Au besoin à renouveler après 1-2 semaines ou dans un plus bref délai.

MODE D'ADMINISTRATION

Administration intraveineuse et intramusculaire chez le bovin et le veau.

Administration intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée chez le chien, le chat et les animaux à fourrure.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

-

10. TEMPS D'ATTENTE

Bovin, veau:

Viande et abats et lait: 0 jours.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

Durée de conservation après ouverture du récipient: 4 semaines.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur l'étiquette après EXP .:

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Aucune.

Le produit peut être utilisé en cas de gravidité ou de lactation.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUEE

Juin 2020

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Flacon en verre contenant 50 ml, 100 ml ou 250 ml.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

À usage vétérinaire.

Sur prescription vétérinaire.

BE-V040975