

## **B. NOTICE**

**NOTICE**

Chorulon 1500 I.U. Lyophilisat et solvant pour solution injectable

**1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Pays-Bas

Représenté par:

MSD Animal Health SPRL  
Clos du Lynx 5  
1200 Bruxelles

Fabricant responsable de la libération des lots:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Pays-Bas  
ou  
Intervet International GmbH, Feldstraße 1A, 85716 Unterschleißheim, Allemagne

**2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Chorulon 1500 I.U. Lyophilisat et solvant pour solution injectable  
Gonadotrophine. chorionique

**3. LISTE DE LA SUBSTANCE ACTIVE ET AUTRES INGRÉDIENTS**

Chaque flacon de substance active contient:

**Substance active:** Gonadotrophine. chorionique

Chaque flacon de solvant contient: solvant stérile jusqu'à 5 ml.

**4. INDICATIONS**

- |                |   |
|----------------|---|
| Vache, génisse | - induction de l'ovulation et formation du corps jaune favorisent la fécondation et la conception                           |
|                | - syndrome du kyste ovarien anoestrus, chaleurs prolongées, nymphomanie suite à une dégénérescence d'un follicule kystique. |
| Jument         | - induction de l'ovulation et formation du corps jaune favorisent la fécondation et la conception                           |
|                | - anoestrus (ovulation retardée avec follicules > 2 cm de diamètre).  |
| Chienne        | - anoestrus   |
|                | - ovulation tardive et chaleurs prolongées  |
|                | - induction de l'ovulation.   |
| Chien          | - cryptorchidie   |
|                | - libido insuffisante.  |

**5. CONTRE-INDICATIONS**

Aucune connue.

**6. EFFETS INDÉSIRABLES**

Comme avec toutes les préparations contenant des protéines, des réactions anaphylactiques peuvent survenir exceptionnellement directement après le traitement.

Thérapie: injection d'adrénaline (1:1000) voie intraveineuse ( I.V.) ou intramusculaire ( I.M.) I.V. ou I.M. immédiatement après l'apparition des symptômes de choc.  
Eventuellement soutenir avec un traitement aux corticostéroïdes.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

## 7. ESPÈCES CIBLES

Cheval, bovin et chien.

## 8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIES ET MODE D'ADMINISTRATION

Espèce animale	Indications
Vache, génisse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- induction de l'ovulation: 1500 U.I. à l'insémination ou lors de la saillie I.M. ou I.V.</li> <li>- syndrome du kyste ovarien: 3000 U.I. I.V.</li> </ul>
Jument	<ul style="list-style-type: none"> <li>- induction de l'ovulation: 1500 - 3000 U.I. lors de la saillie I.V.</li> <li>- anoestrus (ovulation retardée avec follicules &gt; 2 cm de diamètre): 1500 - 3000 U.I. I.M. ou I.V. ; si nécessaire, répéter le traitement après 2 jours</li> </ul>
Chienne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- anoestrus: après traitement préalable au PMSG, 500 U.I. le premier jour des chaleurs I.M. ou I.V., quotidiennement pendant 10 jours</li> <li>- ovulation tardive et chaleurs prolongées: 100 - 500 U.I. I.M. ; répéter le traitement quotidiennement jusqu'à disparition des pertes vaginales</li> </ul>
Chien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cryptorchidie: 2 fois par semaine 100 - 500 U.I. I.M. pendant un maximum de 6 semaines</li> <li>- libido insuffisante: 100 à 500 U.I. I.M. 6 à 12 heures avant l'accouplement</li> </ul>

*Répétition de l'injection:*

- autres indications chez la femelle: si nécessaire tous les 3 à 7 jours
- autres indications chez le mâle: 2x par semaine pendant 4 à 6 semaines.

*Voie d'administration:*

Mettre le lyophilisat en suspension dans le solvant fourni et administrer suivant l'indication, en injection intraveineuse (I.V.) ou intramusculaire (I.M.).

## 9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

-

## 10. TEMPS D'ATTENTE

Bovin: Viande et abats: 0 jour.  
Lait: 0 jour.  
Cheval: Viande et abats: 0 jour.

## 11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 3 ans.

Durée de conservation après première reconstitution conforme aux instructions: 24h, conserver entre 2°C-8°C

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'emballage extérieur précédée par "EXP.:".

## 12. MISES EN GARDE PARTICULIÈRES

### Précautions particulières d'utilisation chez l'animal

Le traitement de la cryptorchidie chez les chiens peut être efficace dans certains cas, à condition que le canal inguinal ne soit pas obstrué et que le traitement commence tôt.

### Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux

Il faut éviter une auto-injection accidentelle. En cas d'une auto-injection accidentelle, consultez immédiatement un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

### Utilisation en cas de grossesse, de lactation ou de ponte

L'utilisation en cas de grossesse et de lactation n'est pas d'application.

### Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes)

Un surdosage est sans conséquences négatives particulières.

## 13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

## 14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

Septembre 2015

## 15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

**Mode de délivrance:** sur ordonnance vétérinaire.

**Numéro d'enregistrement:** BE-V059315