

B. NOTICE

NOTICE
SOLIGENTAL 3000 UI/ml collyre en solution

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

VIRBAC

1ère avenue - 2065 m L.I.D.

06516 Carros

France

Fabricant responsable de la libération des lots :

VIRBAC

1ère avenue - 2065 m L.I.D.

06516 Carros

France

ou

LABIANA LIFE SCIENCE, S.A

C/Venus, 26, Ind Can Parellada Terrassa

08228 Barcelona

Espagne

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

SOLIGENTAL 3000 UI/ml collyre en solution

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Chaque ml contient :

Principe actif:

Gentamicine.....	3000	UI
(sous forme de sulfate)		

Excipient(s):

Edétate disodique, Acide parahydroxybenzoïque

4. INDICATION(S)

Chez les chiens et les chats :

Traitement curatif des conjonctivites bactériennes et des kératoconjonctivites dues aux germes sensibles à la gentamicine, comme confirmé par un antibiogramme.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas administrer aux animaux présentant une hypersensibilité connue à la gentamicine ou d'autres aminoglycosides.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

De rares cas d'intolérance locale (réactions inflammatoires conjonctivales) peuvent être observés en début de traitement. Ces signes, de très faible intensité et toujours transitoires, disparaissent spontanément sans traitement particulier.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chien et chat.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

900 UI de gentamicine par jour pendant 8 jours, soit 3 instillations de 2 gouttes de produit par jour pendant 8 jours.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Instiller la solution dans le cul du sac conjonctival à l'aide du dispositif d'application.

10. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le flacon.

Après ouverture, à utiliser dans les 15 jours.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

Afin d'éviter toute contamination de la solution, reboucher le flacon après usage.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :

Les personnes présentant une hypersensibilité connue aux aminoglycosides devraient éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.

Bien se laver les mains après utilisation.

Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte :

La gentamicine traverse la barrière placentaire et peut donc provoquer (induire) des effets toxiques dans le fœtus quand de forts dosages sont administrés aux mères.

SOLIGENTAL est une solution ophtalmique et l'absorption de la gentamicine pourrait être négligeable ; Par conséquent, le produit pourrait donc être administré pendant la gestation et la lactation.

Surdosage :

En cas de surdosage, la régénération de l'épithélium de la cornée peut être retardée.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

Novembre 2017

BE-V210953

A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.